



Tenkes Hegyközség
Siklós

Tenkes Borvidékfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft.

7800 Siklós, Felszabadulás u. 80.

Telefon/Telefax: 72/579-242, 30/216-45-61

1. Szőlőültetvények - borszőlő (szeptember 1. utáni szüretelésű) növényvédelmi technológiai javaslata 2017. augusztus 1 - 10. közötti időszakra

Károsító	Javasolt készítmény	Hatóanyag	Dózis	MVI	ÉVI
peronoszpóra	Montaflow	rézoxiklorid	0,3%	0	21
lisztharmat	Kumulus S	elemi kén	0,4%	0	0

MVI: munkaegészségügyi várakozási idő (napokban)

ÉVI: élelmezés-egészségügyi várakozási idő (napokban)

Az ökológiai termesztésben lisztharmat ellen az elemi kén tartalmú szerek, mint pl. Cosavet DF, Kumulus S, Microthiol Special, Thiovit Jet, Eurokén, míg a szőlőperonoszpóra ellen a réztartalmú szerek sokasága áll rendelkezésre (Champion WG, Champ, Cuproxat FW, Funguran OH, stb.). A szerek hatékony kijuttatásához tapadásfokozó készítmény - pl. Káliszappan, Nonit, Wetcit, Spur - szükséges.

A sérült bogyójú, valamint a zsendülésben lévő szőlőterületeken szürkepenész ellen is kell védekeznünk. Erre az alábbi, III. kategóriájú készítmények valamelyike alkalmas (a szerek mindegyike keverhető a lisztharmat és peronoszpóra elleni készítményekkel is):

- Chorus 50 WG (ÉVI: 14 nap)
- Teldor 500 SC (ÉVI: borszőlő: 14 nap, csemegeszőlő: 7 nap)
- Switch 62,5 WG (ÉVI: borszőlő: 21 nap)

Szürkepenész ellen az ökológiai termesztésben lévő ültetvényben - kizárólag önálló kijuttatásban - a Botector nevű szabadforgalmú készítmény engedélyezett (ÉVI: 0 nap).

2. Gyümölcsösök növényvédelmi technológiai javaslata 2017. augusztus 1 - 10. közötti időszakra

Károsító	Javasolt készítmény	Hatóanyag	Dózis	MVI	ÉVI
monília, varasodás	Montaflow	rézoxiklorid	0,3%	0	10
levéltetvek	Pirimor 50 WG	pirimikarb	0,05%	0	10
lisztharmat	Kumulus S	elemi kén	0,4%	0	0

MVI: munkaegészségügyi várakozási idő (napokban)

ÉVI: élelmezés-egészségügyi várakozási idő (napokban)

A szerek kijuttatásához tapadásfokozó készítmény - pl. Káliszappan, Nonit, Wetcit, Spur - szükséges.

Az érésben lévő gyümölcsösökben - meggy, kajszli- és őszibarack, szilva, málna - a monília tud komolyt kárt tenni a betakarítás előtti termésben, néhány nap alatt akár 100 % termés vesztséget is okozva. A betakarítás előtt monília ellen pl. a Teldor 500 SC készítmény alkalmazható rövid élelmezés-egészségügyi várakozási ideje miatt (1-3-7 nap).

Jelenleg **erős** fertőzési veszély áll fenn:

- ▶ szőlő: [lisztharmat](#), peronoszpóra, szürkepenész
- ▶ alma, körte: [levéltetű](#), monília, [lisztharmat](#)
- ▶ őszibarack: [levéltetű](#), [monília](#)

További szakmai információ kérhető a szarkat@t-online.hu elektronikus levélcímen, vagy a 30/216-45-61 mobil telefonszámon, 17:00 és 19:00 között.

Siklós, 2017. július 31.

Szarka Tibor György
okl. agrárkémikus agrármérnök



Tenkes Hegyközség
Siklós