



Tenkes Hegyközség
Siklós

Tenkes Borvidékfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft.

7800 Siklós, Felszabadulás u. 80.

Telefon/Telefax: 72/579-242, 30/216-45-61

1. Szőlőültetvények növényvédelmi technológiai javaslata 2018. május 29- június 10. közötti időszakra

Károsító	Javasolt készítmény	Hatóanyag	Dózis	MVI	ÉVI
peronoszpóra	Kupfer Fusilan WG	rézo. + cimoxanil	0,3%	0	28
lisztharmat	Kumulus S	elemi kén	0,4%	0	0
	Topas 100 EC	penkonazol	0,03%	0	14

MVI: munkaegészségügyi várakozási idő (napokban)
ÉVI: élelmezés-egészségügyi várakozási idő (napokban)

Tapadásfokozó segédanyag: **Nonit** (0,025%) vagy **Biosol-Kálishappan** (1,0%)

2. Gyümölcsösök növényvédelmi technológiai javaslata 2018. május 29- június 10. közötti időszakra

Károsító	Javasolt készítmény	Hatóanyag	Dózis	MVI	ÉVI
varasodás, monília	Chorus 50 WG	ciprodinil	0,4%	0	14/21
rovarkártevők	Karate Zeon	lambda-cihalotrin	0,03%	0	3/7
lisztharmat	Kumulus S	elemi kén	0,4%	0	0

MVI: munkaegészségügyi várakozási idő (napokban)
ÉVI: élelmezés-egészségügyi várakozási idő (napokban)

Karate Zeon helyett Kaiso EG, vagy Full 5 CS, esetleg Ninja Zeon 5 CS is használható.

Kumulus S helyett bármely más elemi kén tartalmú készítmény - pl. Cosavet DF, Eurokén 2000, Microkén, Microthiol Speciál, Necator Plus, Sulgran - használható, azonos dózisban

Tapadásfokozó segédanyag: **Nonit** (0,025%) vagy **Biosol-Kálishappan** (1,0%)

Az ökológiai (bio) termesztésben - **a rézérzékenység figyelembe vételével** - réztartalmú készítményt használjunk (pl. Montaflo, Champ, Champion, Cuprosan, Funguran, Nordox) monília, varasodás ellen.

A nagy meleg miatt a gyümölcsök korábban érnek, így az élelmezés-egészségügyi várakozási idők betartására figyeljünk.

Betakarítás előtt néhány nappal már csak a Teldor 500 SC a jó megoldás a monília elleni védekezésben, a rövid, 3/7 napos élelmezés-egészségügyi várakozási ideje miatt.

A kezelést szélcsendes időben, száraz ültetvényben kell elvégezni, virágzó növények közelében este (sötétedés előtt), 25 °C léghőmérséklet alatt. A permetezést követő 2 órán belül lehulló csapadék a kezelés hatékonyságát jelentősen csökkenti.

Gyümölcsösben, zöldségféléken, dísnövényeken erős levéltetű fertőzés indult meg. A védekezés sikere az alkalmazható szerek folyamatos váltogatásában, és a soron kívül megismételt kezelésekben van.

A levéltetvek ellen alkalmazható készítmények:

- Tepeki - speciális levéltetű elleni készítmény, hosszú hatástartammal
- Mospilan 20 SP/SG (Spilan, Gazelle) - más állati károsítók - bogarak, hernyók - elleni védekezésben is használható
- Pirimor 50 WG - csak levéltetű ellen ad védelmet
- Actara SC - más rovarok elleni védekezésben is használható, II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szer
- Apacs 50 WG - más rovarok - burgonyabogár, körte levélbolha, alma vértetű - elleni védekezésben is használható, II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szer
- Chess 50 WG - levéltetű és liszteske ellen ad védelmet, II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szer.

Az ökológiai termesztésben a Vegarep EC, Vektafid A készítmények alkalmazhatók levéltetvek ellen.

További szakmai információ kérhető a szarkat@t-online.hu elektronikus levélcímen, vagy a 30/216-45-61 mobil telefonszámon, 17:00 és 19:00 között.

Siklós, 2018. május 28.

Szarka Tibor György
okl. agrárkémikus agrármérnök

Tenkes Hegyközség
Siklós