



Tenkes Hegyközség  
Siklós

Tenkes Borvidékfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft.

7800 Siklós, Felszabadulás u. 80.

Telefon/Telefax: 72/579-242, 30/216-45-61

### 1. Szőlőültetvények növényvédelmi technológiai javaslata 2018. május 01-10. közötti időszakra

Károsító	Javasolt készítmény	Hatóanyag	Dózis	MVI	ÉVI
peronoszpóra	Dithane (Manzate, Vondozeb)	mankoceb	0,2%	0	56
lisztharmat	Kumulus S	elemi kén	0,4%	0	0
növénykondicionáló	Amalgerol	növényi kivonat	max. 1%	0	0

MVI: munkaegészségügyi várakozási idő (napokban)  
ÉVI: élelmezés-egészségügyi várakozási idő (napokban)

Tapadásfokozó segédanyag: **Nonit** (0,025%) vagy **Biosol-Kálishappan** (1,0%)

Az Amalgerol helyett használható pl. MEGAFOL készítmény is, 0,3 %-os koncentrációban.

Az ökológiai (bio) termesztésben réztartalmú készítményt használjunk a Dithane helyett (pl. Montaflo, Champ, Champion, Cuprosan, Funguran, Nordox).

### 2. Gyümölcsösök növényvédelmi technológiai javaslata 2018. május 01-10. közötti időszakra

Károsító	Javasolt készítmény	Hatóanyag	Dózis	MVI	ÉVI
varasodás, monília	Dithane (Manzate, Vondozeb)	Mankoceb	0,2%	0	30
rovarkártevők	Mospilan (Spilan, Gazelle)	acetamiprid	0,02%	0	14
lisztharmat	Kumulus S	elemi kén	0,4%	0	0
növénykondicionáló	Amalgerol	növényi kivonat	max. 1%	0	0

MVI: munkaegészségügyi várakozási idő (napokban)  
ÉVI: élelmezés-egészségügyi várakozási idő (napokban)

Tapadásfokozó segédanyag: **Nonit** (0,025%) vagy **Biosol-Kálishappan** (1,0%)

Az Amalgerol helyett használható pl. MEGAFOL készítmény is, 0,2 %-os koncentrációban.

Az Amalgerol helyett használható pl. MEGAFOL készítmény is, 0,3 %-os koncentrációban.

Az ökológiai (bio) termesztésben réztartalmú készítményt használjunk a Dithane helyett (pl. Montaflo, Champ, Champion, Cuprosan, Funguran, Nordox).

Korai érésű cseresznye esetében a monília elleni védekezéshez használjunk Chorus 50 WG, Luna Privilege, Teldor 500 SC készítmények valamelyikét. Betakarítás előtt néhány nappal már csak a Teldor 500 SC lehet jó megoldás, a rövid, 3 napos élelmezés-egészségügyi várakozási ideje miatt.

A kezelést szélcsendes időben, száraz ültetvényben kell elvégezni, virágzó növények közelében este (sötétedés előtt). A permetezést követő 2 órán belül lehulló csapadék a kezelés hatékonyságát jelentősen csökkenti.

Jelenleg fertőzési veszély áll fenn:

- ▶ cseresznye, meggy: monília, levéltetű
- ▶ alma, körte: levéltetű, molyok, almalisztharmat, varasodás
- ▶ őszibarack: levéltetű, tafrinás levélfoltosság

További szakmai információ kérhető a [szarkat@t-online.hu](mailto:szarkat@t-online.hu) elektronikus levélcímen, vagy a 30/216-45-61 mobil telefonszámon, 17:00 és 19:00 között.

Siklós, 2018. április 30.

Szarka Tibor György  
okl. agrárkémikus agrármérnök



Tenkes Hegyközség  
Siklós